POUR TE PROTÉGER DES TIQUES, C'EST FACILE !

> Tu dois mettre ton pantalon dans tes chaussettes pour empêcher que la tique rentre.

> Pour protéger tes bras, tu dois mettre des manches longues, ça veut dire jusqu'à tes mains.

> Pour cacher ta tête des vilaines tiques, mets un chapeau.

> Pour voir s'il y a une tique sur toi, il faut que tes vêtements soient clairs (rose, bleu comme le ciel, vert clair…). Quand tu rentres chez toi , après avoir enlevé tes vêtements demande à l'un de tes parents de bien contrôler qu'il n'y a pas de tiques sur toi.

> Tu peux aussi utiliser des répulsifs.

> Si tu trouves une tique sur toi, tu dois la retirer avec une pince tire-tique que tu peux trouver en pharmacie ou chez un vétérinaire.

Tu dois consulter vite ton médecin.



La Lumière de Jade

Pour plus d'informations, consultez le site de l'association

Adhésion possible à l'association

Ou par email :
lalumieredejade@gmail.com

Ou par la page Facebook:
La lumière de Jade

« Une tique, ça nous casse la vie »

Jade

HISTOIRE DE JADE
(Ambassadrice des enfants)

Jade vit un combat depuis ses 2 ans et demi.
Après 5 ans d'errance médicale,
d'incompréhension et après un long
cauchemar le diagnostic tombe à l'âge
de 7 ans après 2 tests de dépistage :
- Maladie de Lyme et
co - infections stade chronique

Ce combat est quotidien car Jade
est souvent malade et ses parents
ne perçoivent aucune aide.
Nous nous battons chaque jour pour
une reconnaissance et une prise
en charge de la maladie.

La maladie de Lyme, aussi appelée Borréliose
se transmet par une piqûre de tique.
Les tiques se nourrissent de sang.
Elles attendent leurs proies dans les hautes
herbes (en forêt, dans les champs, le long
des chemins et dans les jardins).

Les animaux sauvages comme les cerfs,
les renards, les souris, les lièvres, les oiseaux,
etc... peuvent avoir des tiques sur eux.
Mais également les animaux domestiques,
comme les chiens et les chats qui se
promènent dehors.

Et parfois cela peut aussi nous arriver,
si comme moi tu aimes jouer dans la nature.

Les tiques aiment se cacher aux endroits
chauds de notre corps.

LES SYMPTÔMES

> PHASE PRIMAIRE

Quelques jours après la piqûre, il se peut
qu'un érythème migrant se présente,
sa forme et sa taille varient. Il grossit
puis disparait au bout de quelques jours.
L'apparition de l'érythème migrant n'est pas
systématique.
Autres signes :
les symptômes grippaux
qui se manifestent par de
la fièvre, des courbatures,
ou de la fatigue.

> PHASE SECONDAIRE

S'il n'y a pas de prise d'antibiotiques
pendant la phase primaire, de nouvelles
manifestations vont apparaitre :
symptômes grippaux, de terribles fièvres,
forts maux de tête, de gorge, grande
fatigue, douleurs dans les jambes,
les coudes (partout), problèmes digestifs,
paralysie faciale…

> PHASE CHRONIQUE

Si les 2 premières phases ne sont pas
soignées non plus, alors des atteintes
chroniques plus grave peuvent apparaître
des mois ou des années plus tard.
Provoque des douleurs articulaires,
manifestations neurologiques touchant
la moelle épinière ou le cerveau.